

Эрвибанк (ERVIBANK)

Sitobion avenae



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Тел./факс: (495) 434-5086
433-7347 www.ghservice.ru

Единица упаковки

Коробка, содержащая большую злаковую тлю на злаке.

Размер упаковки: ящик 2.500 мл.

Содержит: ростки озимой пшеницы с приблизительно 500 особями злаковой тли (*Sitobion avenae*).

Применение

Для выращивания паразитарных ос *Aphidius ervi* или *Aphelinus abdominalis* или журчалок *Episyrphus balteatus* в системе растения «хранилище».

Дозировки

Эрвибанк	Норма	м ² /ед-цу	Период (дней)	Частота	Примечание
Профилактика	5/га	2000 м ²	14	-	-
при легком поражении	-	-	-	-	-
при тяжелом поражении	-	-	-	-	-

Применение

- Откройте коробку сразу после получения.
- Возьмите пучок растений из коробки и положите его на отдельный кусок увлажненной минеральной ваты, объемом 2-3 литра. Рекомендуется использовать подвесные горшки (кашпо) диаметром 20 см.
- Разместите его в хорошо освещенном месте: вдоль солнечной стороны главной дорожки, в таком месте, где коробку можно оставить на 10-12 недель.
- Подведите капельницу к пучку для постоянной подачи воды и питательных веществ. Непродолжительный период без воды может оказать пагубное действие. Также обеспечьте соответствующий дренаж для избыточного количества воды.
- Переместите капельницу с пучка на минеральную вату, когда корни начнут расти.
- Наилучшие результаты достигаются, когда растения «хранилища» подвешены над культурой. Это ускоряет рост и делает злаковые растения менее восприимчивыми к ложной мучнистой росе.

Условия окружающей среды

Система работает до температуры около 30°.

Примечания

- Если тля будет обнаружена до того, как растения «хранилища» произведут первых паразитов, используйте эрвипар (не менее 0,5 на м²).
- Тля на растениях «хранилищах» очень чувствительна к инсектицидам (также Pirimor!). При применении химических пестицидов, вынесите пучки из оранжереи минимум на 24 часа. Разместите их в месте полностью недоступном для пестицидов.
- Если пестицид вводится через оросительную систему, снимите капельницы с пучков приблизительно на 24 часа. Продукты распада пестицидов медленно выводятся из систем рециркуляции. В таких случаях может быть необходимо временно перейти на другой способ фертигации.
- Злаковая тля может жить только на однодольных растениях. Это значит, что выращиваемые культуры не подвергаются нападению.
- В культурах, на которых эрвибанк ранее не использовался, рекомендуется пробное применение.
- Начать применение афиденд как только гиперпаразит появится среди растений «хранилищ» или на культуре.

Способ действия

На каждом пучке злаковых формируется большая, но слегка колеблющаяся популяция ос *Aphidius ervi*. Важно регулярно добавлять новые пучки для постоянного производства большого количества паразитарных ос. Паразитарные осы активно ищут тлю в культуре.

Визуальный эффект

Уровень заражения тлей остается низким из-за постоянного присутствия большого количества паразитарных ос (ситуация «перепромысла»).